SOBRE LA IDENTIDAD DE *AMBRYSUS (AMBRYSUS) BERGI* MONTANDON Y *A. (A.) OCHRACEUS* MONTANDON (HETEROPTERA, LIMNOCORIDAE)

En nuestro país existen dos especies del género *Ambrysus; A. (A.) bergi* Montandon y *A. (A.) ochraceus* Montandon, cuya identidad resulta bastante problemática de establecer teniendo en cuenta sus rasgos morfológicos externos; las estructuras genitales, si bien pueden servir de ayuda, no son determinantes en la cuestión.

A. (A.) bergi ostenta, como caracteres más distintivos, los bordes laterales del pronoto menos curvados que los de *A. (A.) ochraceus*, y el borde posterior más ancho, lo que le confiere una forma general, con la cabeza incluída, más triangular. Los fémures anteriores son más anchos y ligeramente angulosos (aunque en general conserven su contorno redondeado). Un carácter menos perceptible pero útil, es que el borde lateral del embolio y el del corio se continúan sin inflexión. Para su determinación puede resultar muy práctico considerar el lugar de procedencia, ya que esta especie se localiza en el NO de nuestro país, principalmente en Salta y Jujuy.

A. (A.) ochraceus es muy parecida a la anterior a simple vista, aunque su pronoto es más redondeado en los bordes laterales y más angosto en su base que el de *A. (A.) bergi*. Los fémures anteriores son menos ensanchados y angulosos, aunque mantienen la forma subtriangular. Esta especie se localiza en el centro-oeste del país, llegando hasta la provincia de Río Negro, registrada como límite sur por Bachmann (1963).

Para resolver parte de este problema de identidad, se solicitó al Museo Real de Ciencias Naturales de Estocolmo el ejemplar de *A. (A.) bergi* descripto originariamente por Montandon, que sin embargo no designó como holotipo. La forma del pronoto de este ejemplar resultó coincidente con la de los ejemplares de un lote proveniente de Salta. A pesar de repetidos esfuerzos, no fue posible localizar ejemplares típicos de *A. (A.) ochraceus*, en ninguna de las instituciones donde presumiblemente pudieran estar.

Los ejemplares de *A. (A.) bergi* que se obtuvieron en préstamo del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" estaban etiquetados como *A. (A.) ochraceus*, y viceversa. La determinación había sido efectuada por J. A. De Carlo, quien no tuvo oportunidad de ver el ejemplar original de sus re-descripciones no surge claramente cuales caracteres tomó en cuenta para distinguirlas (De Carlo, 1950).

Cabe destacar que el ejemplar de *A. (A.) bergi* solicitado a Estocolmo tiene como única indicación de procedencia "Buenos Ayres", lo que seguramente es un error, pues no se conoce ningún registro de este género en la provincia; debe tratarse de un término genérico referido a un área geográfica muy amplia.

Se vieron ejemplares de las siguientes localidades:

A. (A.) bergi: Salta (Parque Nacional El Rey, Parque Nacional Baritú, Tartagal, Urundel). Jujuy.

A. (A.) ochraceus: Córdoba (Punilla, Capilla del Monte, Huerta Grande, Copina, quebrada del río Ceballos, Agua de Oro, Calamuchita). San Luis (Luján).

Agradecimiento:

Deseo agradecer al Dr. Axel O. Bachmann por la lectura crítica del manuscrito.

BIBLIOGRAFIA:

Bachmann, A.O. 1963. Apuntes para una hidrobiología argentina VI. Los Hemiptera *Cryptocerata* de la Patagonia extracordillerana. Physis 24 (67): 35-37.

De Carlo, J.A. 1950. Géneros y especies de la subfamilia *Ambrysinae* (Hem-*Naucoridae*). An.Soc. Cient. Arg. 40 (1):3-27.

Montandon, A.L. 1897. Hemiptera *Criptocerata*. Fam. *Naucoridae*, sous famillie *Cryptocricinae* Verh. Zool-bot. Ges. Wien. 47: 19-20.

—— 1909. Tableau synoptique des *Ambrysus* et descriptions d'especes nouvelles. Bull. Soc. Sc. Bucarest. Rumania. 17 (5-6): 321, 427-329.

Mónica L López Ruf*

ILPLA, Instituto de Limnología "Dr Raúl A. Ringuelet" UNLP